

エクストラ アイアン (6-0-0)

- 植物の緑色化が早く、徒長なし ●植物の成長に関わる規制に対応
- クロロシスの発生を一晩で是正する ●高度な鉄分のキレート化

(米国メーカー保証値)

窒素(N) 6%
尿素 6%
鉄(Fe) 10%
結合硫黄(S) 4%

(各成分の由来)

尿素、硫酸鉄

キレート剤 クエン酸

1リットル当りの製品重量 1.34kg
容量 10リットル×1本

(商品説明)

- ・他の競合品に比べて、鉄が多く含まれています。
- ・植物の葉面、根元にすぐに効果があるように、100%溶解された鉄を使用しています。
- ・鉄と窒素のユニークな複合体で構成されていて、鉄を溶解して植物の緑を引き立たせ、徒長を防ぎます。
- ・エクストラアイアンは、光合成に必要な3つの栄養素を含有しています。即ち、鉄、窒素、硫黄です。
- ・エクストラアイアンは、殺虫剤、殺菌剤、除草剤と共に使用することが可能です。
 - ・エクストラアイアンは、通常の芝生管理に使用すれば、豊かな緑色を引き出し、また、強固な根のつながりを育てて、踏圧にも耐えうるものに仕上げます。
- ・芝生、樹木や観葉植物などに用いて、鉄分の不足やクロロシスに対応できます。

(使用上の注意)

- ・目に入った場合は、直ちに十分な水量で目を洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ・ほとんどの肥料、薬剤との混合が可能ですが、念のため事前にジャーテストで沈殿現象などが生じないことを確認してから、使用してください。

(保管方法)

- ・子供の手の届かない所に保管してください。
- ・栓をしっかりと閉めて冷暗所に保管してください。

(使用方法)

1. ベントグラスのグリーン、ティーランド
㎡当り 0.6cc 希釈率195~330倍 2週間に一度
2. フェアウェイ
㎡当り 1.25cc 希釈率100~160倍 1ヶ月に一度
3. ブルーグラスやその他北方原産の草
㎡当り 1.25cc 希釈率160倍 3週間に一度、または色合いに合わせて便宜
4. パヒイヤ、Centipedegrass
芝生の高さ1.5インチ以下 ㎡当り 0.94~1.25cc 希釈率160倍 2~3週間に一度
5. Tail Fescue, St. Augustine grass, Zysiagrass
芝生の高さ1.5インチ以上 ㎡当り 1.56~1.88cc 希釈率110~130倍 2~3週間に一度、または色合いに合わせて便宜
6. 追い播きの場合
㎡当り 0.6~1.2cc 希釈率160~200倍 1ヶ月に一度 または、色合いに合わせて便宜
7. 運動場
㎡当り 1.25cc 希釈率100~160倍 1ヶ月に一度 または、色合いに合わせて便宜

(混合方法)

- ・タンクミックスの場合、水は容器の半分しか入れないでください。その後、色々なものを入れる余地を残しておくためです。そして、エクストラアイアンを加え、攪拌してください。除草剤を入れている時は、攪拌しないでください。攪拌すると泡立ちます。除草剤を入れた後に、攪拌してください。更に、他のものを入れる場合は、次の順番にしてください。

- ① 尿素およびその他のN-P-K肥料を入れる。
- ② 殺虫剤、殺菌剤を入れる。
- ③ 除草剤は最後に入れてください。

それぞれの項目の薬品を入れるごとに、攪拌してください。タンクミックスして作ったものは、数時間以内に使い切るようにしてください。また、噴霧する前にも攪拌することを忘れないでください。