

サバンナ ミスト8号 (15-2-15)

50%緩効性窒素に微量元素をプラス。
窒素分のうち、50%がメチレン尿素。

●葉面と根から吸収 ●塩化物、硝酸塩を含まない ●病害に対する抵抗力

(米国メーカー保証値)

全窒素 (N) 15%

7.5% 尿素 (Urea Nitrogen)

7.5% 緩効性水溶性窒素 (Slowly Available Water Soluble Nitrogen) *

りん酸 (P₂O₅) 2%

加里 (K₂O) 15%

鉄 (Fe) 0.1%

銅 (Cu) 0.05%

亜鉛 (Zn) 0.05%

マンガン (Mn) 0.05%

(各成分の由来)

尿素、メチレン尿素、炭酸カリ、りん酸、鉄 EDTAキレート、
銅 EDTAキレート、亜鉛 EDTAキレート、マンガン EDTAキレート
キレート剤 EDTA (エチレンジアミン四酢酸塩)

* 50% 緩効性窒素は、メチレン尿素より由来

1リットル当りの製品重量 1.31 kg

容量 10リットル×1本

(商品説明)

・50%緩効性窒素を含有し、高品質の工業および食品品質の原料
から作られています。

・速効性窒素50%と連続安定供給用としての緩効性窒素50%とが
バランスをとって供給します。

・加里は水溶性の摂取しやすい形で葉と根の両方から
吸収され、茎の自立をうながし、病害に対する抵抗力を
増加します。

・ニトロ-30 (メチレンジウレア) 由来のメチレン尿素を含有し、徒長
(植物の茎だけが伸びる事)を引き起こすことなく、迅速に緑色を
強め、且つ残効性を有します。

・加里は非塩化物由来です。

・芝草のみならず樹木や花きの葉面散布、及び土壌注入処理用と
しても最適です。

・殺虫剤、除草剤、殺菌剤と相容性を有し、混合散布が可能です。

(使用方法)

- ・寒冷型、暖地型、全ての芝草に施用できます。
- ・2~3週間毎に、㎡当り2~4ccを散布してください。
- ・希釈倍率は、50~150倍が効果的です。

全商品の㎡当り散布量表(原液、散布水量)を
参考までに添付してあります。
御参照ください。

(混合)

・まず水で希釈する前に他の濃縮溶液と混合はしないでください。

- ・希釈する前に、充分な量の水を混合タンクに入れてから、
ミスト8号を加えてください。
- ・混合は、ミスト8号を希釈後、次の手順を守ってください。
1)水和剤、2)フロアブル、3)水溶性剤、4)界面活性剤、
5)乳化可能な原液

それぞれの製品を添加している間は、必ず攪拌をしてください。
薬剤を混合する際には、それぞれの薬剤の混合指示をよく
守ってください。

・高品質なpH調整液を用いれば、酸性、アルカリ性の製品との
混合が可能です。

(使用上の注意)

- ・目に入った場合は、直ちに充分な水量で目を洗い流し、医師の
診断を受けてください。
- ・ほとんどの肥料、薬剤との混合が可能です。念のため事前に
ジャーテストで沈殿現象などが生じないことを確認してから、
使用してください。

(保管方法)

- ・子供の手の届かない所に保管してください。