



サバンナ ミスト10号 (0-29-26) 亜りん酸

●発根促進 ●夏のストレスの低減 ●迅速な吸収 ●病原体に対する抑止力

(米国メーカー保証値)

りん酸 (H_3PO_3) 29%
加里 (K_2O) 26%

(各成分の由来)

りん酸、水酸化カリウム

1リットル当りの製品重量 1.49 kg
容量 10リットル×1本

(商品説明)

- ・亜りん酸一カリウムおよび亜りん酸二カリウム含有の高濃度りんとカリウム栄養素溶液です。
- ・透明な溶液は高溶解性で植物組織に迅速に吸収されます。
- ・葉の組織や根から吸収され、直ちに栄養不足を修正し、植物の成長や活力を改善します。
- ・亜りん酸の栄養素は、芝生やすべての植物の成長を改善します。
- ・土壌および葉面散布にも使用できます。
- ・りんは窒素に次いで二番目に重要であり、光合成や根の発達に重要な役割を果たします。

(混合)

- ・まず水で希釈する前に、他の濃縮溶液と混合しないでください。殺菌剤、殺虫剤、除草剤と混合する場合は、適切な量の水をタンクに加えてください。
- ・混合は、ミスト10号を希釈後、次の手順を守ってください。
1)水和剤、2)フロアブル、3)水溶性剤、4)界面活性剤、5)乳化可能な原液

それぞれの製品を添加している間は、必ず攪拌をしてください。
薬剤を混合する際には、それぞれの薬剤の混合指示をよく守ってください。

(使用方法)

- ・寒冷型、暖地型、全ての芝草に施用できます。
- ・2～3週間毎に、 m^2 当り0.5～3ccを散布してください。
- ・希釈倍率は、100倍～150倍が効果的です。

全商品の m^2 当り散布量表(原液、散布水量)を参考までに添付してあります。
御参照ください。

(使用上の注意)

- ・銅含有製品と一緒に混合して施用しないでください。
- ・ミスト10号と界面活性剤または農薬補助剤と一緒に使用しないでください。
- ・目に入った場合は、直ちに十分な水量で目を洗い流し医師の診断を受けてください。
- ・ほとんどの肥料、薬剤との混合が可能です。念のため事前にジャーテストで沈殿現象などが生じないことを確認してから、使用してください。

(保管方法)

- ・子供の手の届かない所に保管してください。