

# スーパーコンバット (5-0-0)

●葉面散布による白化現象(黄化現象)防止 ●8種のキレート化された微量栄養素

## (米国メーカー保証値)

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 窒素 (N) 5 %             |          |
| 尿素 (Urea Nitrogen) 5 % |          |
| 鉄 (Fe)                 | 6.0 %    |
| 銅 (Cu)                 | 0.5 %    |
| 亜鉛 (Zn)                | 0.5 %    |
| マンガン (Mn)              | 0.5 %    |
| マグネシウム (Mg)            | 0.5 %    |
| ほう素 (B)                | 0.02 %   |
| モリブデン (Mo)             | 0.0005 % |
| 結合硫黄 (S)               | 4.0 %    |

## (各成分の由来)

尿素、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、硫酸マグネシウム、ほう酸ナトリウム、ほう酸モリブデン

## キレート剤 クエン酸

1リットル当りの製品重量 1.4kg  
容量 10リットル×1本

## (商品説明)

- ・芝草、樹木、観賞植物の白化現象(黄化現象)(マグネシウムなどの欠乏によって起こる緑色消失の病気)を防止するために使われてきた8種の微量栄養素をキレートの形で含有する溶液で水に完全に溶解します。
- ・クエン酸と窒素の独特なキレート結合が突然の急激な徒長を防ぎます。
- ・スーパーコンバットの全ての栄養素は、葉面および根元からでも吸収されます。
- ・毒性作用は全くなく、芝草の成長季節を通じていつでも使用可能です。
- ・病気や冬の乾燥やストレスに対する抵抗力を強めます。更に白化現象(黄化現象)に陥った植物を48時間以内に健康な緑色に戻します。ベント芝は24時間以内に回復し、2~3週間は緑色を保ちます。
- ・スーパーコンバットはハーブ類の植物に散布して黄色化を減らすこともできます。

## (使用方法)

- ・寒冷型、暖地型、全ての芝草に施用できます。
- ・2~3週間毎に、㎡当り0.5~1.5ccを散布してください。
- ・希釈倍率は、100~200倍が効果的です。

全商品の㎡当り散布量表(原液、散布水量)を参考までに添付してあります。御参照ください。

## (混合)

- ・スーパーコンバットを加えるまえにタンクに水を入れて攪拌してください。
- ・他の濃厚な液体肥料と決して混合はしないでください。そして常にまず水で希釈してください。いつも使うときは十分な水を加えてください。
- ・他の肥料等を加える場合は、必ず加える前にタンクを攪拌してください。
- ・高品質なpH調整液を用いれば、酸性、アルカリ性の製品と混合ができます。

## (保管方法)

- ・子供の手の届かない所に保管してください。

## (使用上の注意)

- ・目に入った場合は、直ちに十分な水量で目を洗い流し医師の診断を受けてください。