


アジフォル® アミノガード®




アミノ酸の補給に!


アジフォル®アミノガード®は高濃度のアミノ酸や植物由来成分、発酵微生物由来成分、糖などを豊富に含んでいるバイオスティミュラントです。**植物を元気に**します。



発酵法



単分子アミノ酸



味の素(株)は発酵法により、単分子の遊離アミノ酸を含む肥料を製造しています。植物の細胞壁より吸収されやすい形になっているので、効果の早さが違います。



(1.3kg/1ℓ)
(5.2kg/4ℓ)



(1.3kg/1ℓ)
(5.2kg/4ℓ)



アジフォル®アミノガード®
701 (ナナ・ゼロ・イチ)

肥料登録	
生第92416号	
種 類	
液状複合肥料	
保証成分	
・窒素全量	6.8 %
(内アンモニア性窒素 2.8%)	
・水溶性加里	1.2 %
・水溶性マンガ	0.100 %
効果発現促進剤	
・硫酸銅(銅として)	0.9 %
・硫酸亜鉛(亜鉛として)	0.1 %
その他	
・遊離アミノ酸類	15 %

アジフォル®アミノガード®
544 (ゴー・ヨン・ヨン)

肥料登録	
生第93772号	
種 類	
液状複合肥料	
保証成分	
・窒素全量	5.5 %
(内アンモニア性窒素 2.1%)	
・水溶性りん酸	4.0 %
・水溶性加里	4.0 %
・水溶性マンガ	0.100 %
効果発現促進剤	
・EDTA-銅(銅として)	0.8 %
・硫酸亜鉛(亜鉛として)	0.1 %
その他	
・遊離アミノ酸類	14 %

こんな時にお使いください

根からの
養分吸収が
弱いと感じた

農薬と混用で
効率的な
葉面散布をしたい※1

暑熱期に苗質を
維持したい

アミノ酸や
ミネラルを
補給したい

施用方法

- よく混ぜてからお使いください。
- 育苗時、本圃定植後にアジフォル®アミノガード®を500倍～1,000倍に水で希釈し葉面に散布してお使いください。
- 葉物野菜に関しては2,000倍以上に希釈しお使いください。
- 10a当たり希釈液100ℓが目安です。
- 施用回数は7日～10日に1回が目安です。
- 生育具合を見ながら回数を増減してください。
- 使用後は噴霧器など機器内に希釈液が残らないように洗い流してください。
- 目の細かい機器を使用する際は目詰まり防止のためフィルターをご使用ください。

使用上の注意

- 希釈した液は保存出来ません。その日のうちに使い切ってください。
- 成分の結晶が発生することがあります。希釈時によく攪拌してからお使い下さい。
- 冷暗所に保管ください。

- 「石灰硫黄合剤」などアルカリ性資材と混合すると有害ガスが発生する恐れがあります。混合は避けてください。

※1 ミネラルの多い資材や農薬と併用する場合は、沈殿等生じないか事前に少量で試し、問題無いことをご確認ください。